

ID: 400

Qualidade do desejo sexual em mulheres com dor pélvica crônica

Caroline Dos Santos de Carvalho¹, Alessandra Gomes Larrat¹, Joice Rafaela Magalhães dos Santos¹,
Brenda Geovana Bandeira dos Santos¹, Cibele Nazaré Câmara Rodrigues¹

¹Universidade Federal do Pará.

Introdução: A Dor Pélvica Crônica pode ser definida como a Dor Pélvica não cíclica com duração mínima de seis meses, a causa dessa condição pode estar relacionada a disfunções dos sistemas gastrointestinal, uroginecológico, musculoesquelético ou neurológico, gerando um grande impacto na qualidade de vida. Ademais, a função sexual é um elemento vital na vida de uma mulher e envolve uma interação complexa entre fatores biológicos, socioculturais e psicológicos, então, qualquer disfunção nessa área pode afetar a qualidade de vida feminina. Estudos anteriores demonstram uma mudança na qualidade de vida sexual em mulheres que apresentam Dor Pélvica Crônica, o que pode estar relacionado com alterações de desejo, excitação, lubrificação e percepção da sexualidade, sendo necessário uma maneira de quantificar tais alterações. **Objetivo:** Analisar a qualidade do desejo sexual em mulheres com Dor Pélvica Crônica segundo o questionário Female Sexual Function Index (FSFI). **Materiais e Métodos:** Estudo transversal de caráter quantitativo sob Parecer do comitê de Ética 7.080.975, envolvendo 15 mulheres com Dor Pélvica Crônica com idade entre 18 e 60 anos, no período de setembro de 2023 a fevereiro de 2025. Essas pacientes iniciaram atendimento no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC) e durante a avaliação responderam ao questionário Female Sexual Function Index (FSFI). Esse questionário é multidimensional e avalia a função sexual feminina, sendo dividido em cinco domínios: desejo e estímulo subjetivo, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor ou desconforto. Nesse estudo serão analisadas as perguntas relacionadas ao desejo, com score mínimo nesse domínio de 1,2 e o máximo de 6,0. **Resultados e Conclusão:** A média do score apresentado nesse domínio pelas mulheres avaliadas foi de $2,48 \pm 1,24$ e a moda de 1,2, pontuação mínima possível a ser obtida. Os scores obtidos independem da idade e estado civil das pacientes avaliadas. Dessa forma, é possível concluir que há uma alteração no desejo sexual entre mulheres com Dor Pélvica Crônica avaliadas pelo FSFI.

Descritores: dor pélvica crônica; desejo; FSFI.



Copyright Carvalho et al. Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.